



Case description

45 Jahre Frau. Sie tastet einen verschieblichen Mammatumor rechts. Das Ergebnis der durchgeföhrten Mammografie ist: BI-RADS IV.

Imagery



Questions about the case

1. Welcher histologische Mammakarzinomtyp ist auf der Aufnahme "Mikroskopie" zu sehen?
 - A. Duktales Mammakarzinom
 - B. Lobuläres Mammakarzinom
 - C. Medulläres Mammakarzinom
 - D. Gallertkarzinom der Mamma
 - E. Inflammatorisches Mammakarzinom
2. Welche Zuordnung bezüglich der Aufnahme 'Immunhistochemie & CISH' ist richtig?
 - A. links oben: Oestrogenrezeptor immunhistochemisch
 - B. rechts oben: Progesteronrezeptor immunhistochemisch
 - C. links unten: HER-2/neu-Expression immunhistochemisch
 - D. rechts unten: HER-2/neu-Amplifikation mittels CISH
 - E. Alle Aussagen sind richtig.
3. Welche Aussage bezüglich des Mamma-Karzinoms ist richtig?
 - A. Das Mamma-Karzinom ist der 2. häufigste Tumor der Frau
 - B. Mamma-Karzinome kommen nur bei Frauen vor
 - C. Erkranken Männer an einem Mamma-Karzinom werden sie nicht in der Gynäkologie sondern der Urologie betreut
 - D. Für die Prognose der PatientInnen ist vor allem das Stadium und die Biologie der Erkrankung von Bedeutung
 - E. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei ca. 48 Jahren

4. Welche Aussage zur Therapie des Mamma-CA ist falsch?

- A. Die Operation, die Bestrahlung und die medikamentöse Tumorthherapie sind Bestandteile der Therapie des Mamma-CA bei der Frau
- B. Das fern metastasierte Mamma-CA der Frau wird bevorzugt durch eine systemisch-medikamentöse Therapie behandelt
- C. Das inflammatorische Mamma-CA kann nur in palliativer Intention behandelt werden
- D. Im lokal fortgeschrittenen Stadium mit cN+ sollte einer Operation (BET oder Mastektomie) eine neoadjuvante medikamentöse Therapie vorangeschaltet werden.
- E. Eine adjuvante Bestrahlung ist in jedem kurativen Stadium beim Mamma-CA der Frau sinnvoll.

Diagnosis of the case

1,7 cm im Durchmesser großes duktales Mammakarzinom rechts.
TMN-Klassifikation nach UICC 2002: pT1c, pN0 (sn) (0/3), cM0, G2, R0.

Prädiktive Tumormarker:

Oestrogenrezeptor: 90% positiv, Remmele-Score 12/12

Progesteronrezeptor: 20% positiv, Remmele-Score 3/12

HER-2/neu-Expression: fraglich positiv (Score 2+)

HER-2/neu-Amplifikation nach CISh: positiv

Diagnosis - ICD10

Chapter	ICD-10	Diagnosis	In picture	Comment
II. Neubildungen	C50.9	Mammakarzinom	TBD	TBD

Correct answers to the questions

1. (A), 2. (E), 3. (D), 4. (C),

Questions about the case with comments

- A. Falsch! Das Mamma-Karzinom ist sogar der häufigste Tumor der Frau.
- B. Auch Männer können ein Mamma-Karzinom aufweisen.
- C. Falsch! Auch Männer mit Mamma-CA können in der Gynäkologie betreut werden.
- D. Richtig!
- E. Nein, das mittlere Erkankungsalter liegt bei ca. 65 Jahren.
-
- A. Richtig! Gefragt ist jedoch nach der Falschantwort.
- B. Richtig! Gefragt ist jedoch nach der Falschantwort.
- C. Genau, diese Aussage ist falsch! Das inflammatorische Mamma-CA stellt zwar eine aggressive Form des Mamma-CA dar, es gibt jedoch auch kurative Ansätze.
- D. Richtig! Gefragt ist jedoch nach der Falschantwort.
- E. Richtig und zwar immer postoperativ! Gefragt ist jedoch nach der Falschantwort.